

### Carte de Surveillance du Patient

RIVAROXABAN ZENTIVA® 2,5 mg

RIVAROXABAN ZENTIVA® 10 mg

RIVAROXABAN ZENTIVA® 15 mg

RIVAROXABAN ZENTIVA® 20 mg

**Gardez toujours cette carte sur vous  
Montrez cette carte à tout médecin ou  
dentiste que vous consultez avant de  
commencer un traitement**

#### Information à destination des professionnels de santé :

- Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une



valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de RIVAROXABAN ZENTIVA.

#### Que faut-il savoir sur RIVAROXABAN ZENTIVA?

- RIVAROXABAN ZENTIVA fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- RIVAROXABAN ZENTIVA doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. **N'oubliez jamais de prendre votre traitement** afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- Vous ne devez jamais arrêter de prendre RIVAROXABAN ZENTIVA sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.
- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre RIVAROXABAN ZENTIVA.

- Informez votre médecin que vous êtes traité par RIVAROXABAN ZENTIVA avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

#### Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme RIVAROXABAN ZENTIVA, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre RIVAROXABAN ZENTIVA sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin.



Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- douleurs
- gonflement ou sensations d'inconfort
- maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire
- sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires

- si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

**Comment dois-je prendre RIVAROXABAN ZENTIVA?**

- Pour garantir une protection optimale, RIVAROXABAN ZENTIVA
  - 2,5 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
  - 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
  - 15 mg doit être pris au cours des repas,
  - 20 mg doit être pris au cours des repas.

**ZENTIVA**



**Je suis sous traitement anticoagulant par RIVAROXABAN ZENTIVA (rivaroxaban)**

Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Poids :

Autres médicaments/Pathologies :

**En cas d'urgence, veuillez prévenir :**

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Cachet du médecin :

**Veuillez aussi prévenir :**

Nom :

Téléphone :

Lien avec le patient :